

Características demográficas y conductas sexuales de riesgo de los pacientes en profilaxis preexposición (PrEP)

Pérez Gilaberte JB¹, Andreu Navarro L², Antoñanzas Serrano MG³, García Arceiz E¹, Rubira Calvo B¹, Vicente Langarita C¹, Forcen Vicente de Vera A⁴, Caudevilla Martínez MA⁴


1. Medicina Interna, Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza. 2. Facultad de Medicina, Universidad de Zaragoza. 3. Centro de Salud Fuentes Norte, Zaragoza. 4. Enfermedades Infecciosas, Hospital Universitario Miguel Servet, Zaragoza

METODOLOGÍA

Estudio retrospectivo descriptivo incluyendo pacientes en tratamiento con Tenofovir disoproxilol/Emtricitabina y seguidos en la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Miguel Servet desde la aprobación de su indicación en España hasta el 6 de septiembre de 2023, incluyéndose variables demográficas, relativas a sus conductas sexuales, y sus pruebas diagnósticas.

RESULTADOS


Durante el período analizado se ha realizado seguimiento y dispensación de PrEP a 71 pacientes, de los cuales el **95,8% (n=68)** eran **hombres cis** y el 4,2% restante (n=3) eran mujeres transgénero.



El acceso a la PrEP fue **por solicitud del propio paciente** en el 73,2% (n=52) y en el 26,8% (n=19) por recomendación de un facultativo.


Durante el seguimiento 17 pacientes (n=23,9%) abandonaron el seguimiento y la toma de PrEP; el motivo informado más común fue **tener pareja estable**.

Conductas sexuales de riesgo




Adherencia a la recogida de PrEP

■ Óptima (95-100%) ■ Buena (75-95%) ■ Mala (<75%)




Empleo de preservativo

■ Nunca ■ Menos de la mitad de las veces ■ Más de la mitad de las veces ■ Siempre



Estudio ITS el año previo a PrEP

■ No ■ Solo frotis ■ Solo serología ■ Serología y frotis



CONCLUSIONES

- La mayoría de los pacientes seguidos en tratamiento con PrEP son hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres y de nacionalidad española.
- La mayoría presentan buena adherencia a la medicación, mantienen conductas sexuales de riesgo y se habían realizado estudios diagnósticos de ITS el año previo al inicio de la toma de PrEP.